

Cultivo de COLZA de Otoño (Brassica Napus)

- ROTACIÓN:** **ACONSEJALE:** Barbecho-Colza- Cereal
- SUELOS:** Suelos y francos. (No encharcamientos)
- SIEMBRA:** Barbecho (Asentar la superficie con rodillo antes de la siembra)
Siembra directa o mínimo laboreo.(Suelo suelto y con rastrojo bien distribuido, sin maraños)
- FECHA DE SIEMBRA:** Todo septiembre hasta primeros de octubre. Sembrar en seco y regar, si es posible.
- PROFUNDIDAD:** Entre 1,5-2 cm en Línea y Sellarlo
- ANCHURA ENTRE LÍNEAS:** Ideal sembradora de disco monograno de 45-70 cm y de 25-30 cm sembradora de chorro.
- DENSIDAD:** Híbridos (40-60 ud/m²) 400.000-600.000 ud/ha;(2,5-3 kg/ha) Dosis más baja monograno

Una vez Nacida, Valorar Herbicida y Abonar con ENTEC 15-13-13 (12,5 soz)

VARIEDADES:



LG ARCHITECT

LG CARLTON CL

ARSENAL

Su elevado rendimiento y **RESISTENCIA A VIROSIS** la hacen **UNICA** en el mercado.

(España tiene un 60% Tasa Infección virus TUYV 2018)

La CLEARFIELD + productiva y resistente a enfermedades

Su alto contenido en Grasa, Producción y Adaptación, la han convertido en una de las variedades más sembradas

HERBICIDAS:



ASEGURA LA NO NASCENCIA (Consultar Condiciones)

APLICACIÓN	PRODUCTO	DOSIS/ha	CONTROL	OBSERVACIONES
Pre-Siembra Incorporado (residual)	DEVRIKOL (napropamida 45%)	1,5-2 L	Gramíneas papaver y chenopodium	No sembrar cereal hasta pasado 12 meses. No controla sinapis, matricarias y galium
Pre-Post Emergencia Temprana (2-4 hojas)	BUTISAN-S metazacloro 40%	1,5-2 L	Gramíneas, matricarias y dicotiledóneas	Riego o lluvia posterior mejora la eficacia
Post-Emergencia (contacto)	CENTURION PLUS cletodim 12%	0,6-0,8 L	Gramíneas	Aplicación temprana con dosis bajas
Post-Emergencia Temprana (2-4 hojas)	KERB FLO propizamida 40%	1,75 L	Gramíneas y dicotiledóneas	Riego o lluvia posterior mejora la eficacia
Post-Emergencia Temprana (2 a 8 hojas)	CLERANDA Imazamox 1,75%+metazacloro 37,5%	2 L	Gramíneas, synapis y dicotiledóneas	Aplicar solo. No sembrar cereal hasta pasados 4 meses. Sólo variedades Clearfield
Post-Emergencia (contacto)	LONTREL 72 clopiralida 72%	0,120 -0,170 kg	Matricarias, cardos y leguminosas	Aplicación temprana con dosis bajas

ABONADO: (2 Opciones)

		Dosis/ha Secano	Dosis/ha Regadio	
1ª	Cobertera Temprana (Oct-Nov)	ENTEC 15-13-13 (12,5 soz)	250-350 kg	300-500 kg
	Cobertera Temprana (En-Feb.)	ENTEC 24-8-7 (5 soz)	150-200 kg	200-250 kg
		ENTEC 26 +(32,5 soz)	150-200 kg	200-250 kg
	NAC 27 con azufre	150-200 kg	200-250 kg	
2ª	Aplicación Única Cobertera Temprana (Nov-Dic.)	ENTEC 24-8-7 (5 soz)	350-450 kg	500-600 kg

El abonado es similar al cereal, la ventaja que tiene la colza es que devuelve al suelo al 90% de lo aportado.

RECOLECCIÓN Humedad entorno al 9% y buena regulación de cosechadora.

PLAGAS Limacos, pulguilla, GORGOJOS DEL TALLO, silicua, PULGONES, meliquetes- **Consultar**

ENFERMEDADES Phoma, sclerotinia, alternaria, mildiu, pseudocercospora- **Consultar**