

Recomendaciones Cultivos Ajo y Cebolla

Abonado

Aplicación única (Fondo o Cobertera temprana)

ENTEC 13-10-20

ó

ENTEC 15-13-13

Dosis

600 – 800 kg/ha

600 – 800 kg/ha

HERBICIDAS

PRODUCTO	APLICACIÓN	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Challenger (Persistencia y contacto)	 Pre-Emergencia Post-Emergencia Post-Emergencia (Cebollas 3-4 hojas)	2,5 0,75 - 1 2	Control de hoja ancha
Pendimetalina 33% (Persistencia)	Pre-Emergencia ó Post-Emergencia (1-3 hojas)	4 - 5	Control de hoja ancha y gramíneas
Centurion Plus (contacto)	Post-Emergencia	0,8 - 1,6	Control de gramíneas

TRATAMIENTOS FOLIARES

PRODUCTO	PROBLEMA	Dosis/ha	Dosis/15L	Nº Max. Aplicaciones	P.S. (días)
Decis Evo	Lilioceris merdiger y trips.	0,3 - 0,5 L	20 - 30 cc	3	7
Flint Max	Roya y estemfiliam	0,4 kg	20 - 25 g	1	21
Luna Experience	Roya, botritis, esclerotinia y estemfiliosis	0,6 - 1 l	30 - 35 cc	1	7

Corrector de Carencias

Bayfolan-S

3 – 4 l/ha

Por mochila de 150-200 cc/15 L

Consulte su Asesor, llamar al Tfno: 987 75 12 11 ó 630 05 20 09 (NATALIO),

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es

