




## Tratamientos Foliare en CEREALES (Trigo y Cebada)

### FUNGICIDAS

PRODUCTO	DOSIS (l/ha)	Momento de aplicación	Control
	0,6 - 1 (Cebada-Avena)	<b>1º Sintomas en Hojas de la caña</b>  <b>2ª Quincena de Abril</b> ◉ <b>1ª Quincena de Mayo</b>	Septoria, royas, oidio, fusarium, helmintosporios y rincosporiosis...  Máximo: 2 Aplicaciones separadas 14 días (Aviator) y 21 días en (Prosaro)
	0,8-1,25 (Trigos-Triticale)		
	0,75 - 1		

### INSECTICIDAS

	62,5 cc	<b>2ª Quincena de Abril</b> ◉ <b>1ª Quincena de Mayo</b>	Tronchaespigas, lemas, pulgones, garrapático.
---	---------	---	---

CORRECTOR DE CARENCIAS	PRODUCTO	DOSIS (l/ha)
	<b>Bayfolan-S</b>	2,5 - 3

#### NOTA:

- ▶ **MOJAR** uniformemente toda la masa foliar (100-300 l/ha) a 5-6 km/h
- ▶ Con temperaturas superiores a 25º tratar por la mañana o al atardecer.
- ▶ Utilizar a ser posible, **Boquillas Antideriva de Doble Abanico.**

**En caso de realizar un 2º tratamiento, se aconseja realizarlo en estado de HOJA BANDERA desplegada en trigos.**

En caso de duda, llamar al **987 75 12 11** ó **630 05 20 09** (Natalio),

Para más información, visite nuestra web: [www.agronat.es](http://www.agronat.es)