

Recomendaciones del Cultivo de MAIZ

*Maximizar la producción por hectárea, en gran parte,
¡DEPENDE DE TI!*

*La diferencia entre una buena producción y otra excepcional...
¡está en los DETALLES!*

CLAVES PARA EL ÉXITO: → Perfecta Implantación del cultivo

- ▶ Nascencia correcta, uniforme (95-100.000 plantas) y fuerte desarrollo inicial
- ▶ Correcta Fertilización, Riegos y Limpieza de Malas Hierbas.

PASOS A SEGUIR (Riegos por Aspersión)

➤ **ABONADO**  **ENTEC** es el mejor y más económico iniciador que puedes dar a tu cultivo

Dosis

Aplicación única	→	ENTEC 24-8-7 (5 SO ₃)	1.000 – 1.400 kg/ha
o Fracionada	→	ENTEC 24-8-7 (5 SO ₃)	900 + 400 kg/ha
Fondo	→	{ ENTEC 20-10-10 (7,5SO ₃) ENTEC 13-10-20 (7,5SO ₃)	800 – 1.000 kg/ha
+			600 – 800 kg/ha
Cobertera <small>(15-20 Días antes de floración)</small>	→	ENTEC 27% (10 SO ₃) Solución Nitrogenada, Urea	400 – 600 kg/ha

➤ **SEMBRAR** de 100 a 105.000 semillas/ha a una profundidad de 4 cm.

➤ **HERBICIDAS (Pre-emergencia):**  **ADENGO** o  **SPADE Flexx**

REGAR 10-20 L/ha dependiendo tempero y tipo de suelo.

No volver a regar hasta que nazca (salvo casos puntuales).

Regar mucho inicialmente perjudica al cultivo.

➤ **HERBICIDA (Post-emergencia).**

 **LAUDIS**

 **MONSOON active**

➤ **INSECTICIDAS (gusano gris)**

 **decis EXPERT**

Dosis: 75-125 cc/ha.

➤ **RIEGOS uniformes (hacer pozas).** Momentos Críticos 15-25 días antes de la floración.

Recomendaciones del Cultivo de MAIZ

➤ SEMILLAS



- + Densidad
- + Uniformidad mazorca
- + Peso específico
- + Secado
- Altura

Variedades LG	Ciclo	Dosis/ha (Siembra/ Nacida)	Distancia Planta	Surcos (cm)
LG 31.538	500	100.000 (95.000)	19 cm	53
LG 34.90	400/500	100.000 (95.000)	19 cm	53

LG 31.455	400 Medio-L	105.000 (100.000)	18 cm	53
TORQUAZ	400 Medio	105.000 (100.000)	18 cm	53
LG 31.400	400 Corto	105.000 (100.000)	18 cm	53
LIMAGOLD	300 Largo	105.000 (100.000)	18 cm	53

NOVEDAD

NOVEDAD



Variedades DEKALB	Ciclo	Dosis/ha (Siembra/ Nacida)	Distancia Planta	Surcos (cm)
DKC 5526	500 Corto	100.000 (95.000)	19 cm	53
DKC 5404	400 Largo	100.000 (100.000)	19 cm	53
DKC 5016	400 Medio	105.000 (100.000)	18 cm	53
DKC 5362	400 Medio	105.000 (100.000)	18 cm	53
DKC 4933	400 Corto	105.000 (100.000)	18 cm	53
DKC 4974	400 Corto	105.000 (100.000)	18 cm	53
DKC 4726	300 Medio	100.000 (95.000)	19cm	53

NOVEDAD

NOVEDAD

¡Es momento de tomar decisiones!

Déjate ACONSEJAR

- ¿Qué abonado hago? ¿Qué variedad siembro?
- ¿Qué solución herbicida utilizo? ¿Pre, Post-emergencia?
- ¿Cuándo? ¿Cómo?

CONFIA EN LG, DEKALB-BAYER, ENTEC...

CONFIA EN AGRONAT

¡Consúltanos!

Tfnos:
Tienda: 987 75 12 11
Samuel: 615 83 97 97
Roberto: 692 05 41 31
Natalio: 630 05 20 09

Tratamientos Herbicidas en Maíz

APLICACIÓN	PRODUCTO	DOSIS/ha	CONTROL Y OBSERVACIONES
Pre-Emergencia	SPADE® FLEXX (Isoxaflutol 24%+ciprosulfamida 24%) (Dimetenamida 72%)	0,2 - 0,25 L 0,8 + 1 L	Dicotiledóneas difíciles y gramíneas (Amarantus resistentes a ALS) [Es muy IMPORTANTE que llueva o dar un riego después de la aplicación]
Pre-Emergencia Post (hasta 3 hojas) <u>Persistencia</u>	Adengo® (Isoxaflutol 22,5%, tiencarbazona-metil 9%, ciprosumfamid 15%)	0,25-0,33 L	Dicotiledóneas difíciles y gramíneas No sembrar Remolacha hasta pasados 11 meses desde su aplicación. Si remolacha <i>CONVISO SMART</i> No aplicar Adengo ni cualquier otro, que lleve ciprosumfamid (antidoto) Spade Flexx y Monsoson Active hasta 2 años No hacer mezclas con insecticidas organofosforados ni abonos foliares. [Es muy IMPORTANTE que llueva o dar un riego después de la aplicación de (10-20 mm)]
Post-Emergencia Precoz (2-6 hojas) <u>Contacto y Persistencia</u>	CAPRENO® SC (Tembotriona 34,5%, tiencarbazona-metil 6,8%, isoxadifen 13,4%) + OIZYSA® 480SL (Dicamba 48%) + BIOPOWER®	0,25 - 0,29 L 0,3 - 0,5 L 1 - 1,5 L	Abutilon, Xanthium spinosum, strumarium, Daturas, Chenopodium, Amaranthus, Solanum, Cirsium,
Post-Emergencia Precoz (3-4 hojas) <u>Contacto y Persistencia</u>	LAUDIS®WG Tembotriona 20% + MONSOON ACTIVE® (Tiencarbazona-metil 1%, forasulfuron 3%, ciprosumfamid 1,5%) + BIOPOWER®	0,25 - 0,375 kg 1,25 - 1,5 L 1 1,5 L	Poligonum persicaria, aviculare, Cruciferas, Echinocloa, Digitaria, Setaria.....
Post-Emergencia Tardía (4-6 hojas) (Contacto y persistencia)	FLUVA® (Mesotriona 48%) + OIZYSA®	0,25 - 0,3 L 0,3 - 0,5	No sembrar remolacha ni alubias en la rotación. No aplicar más de 3 años seguidos. Control de Amaranthus (resistentes ALS), abutilon, chenopodium album, Datura Stramonium, Solanus, Digitaria, Juncia
Post-Emergencia Precoz (5-8 hojas) (No residual) Contacto	LAUDIS®WG Tembotriona 20% + CUBIX® (Forasulfuron 2,25%, isoxadifen-etilo 2,25%) + BIOPOWER®	0,40 - 0,5 Kg 1,5 - 2,7 L 0,75 - 1 L	Gramíneas: Echinocloa, Digitaria, Setaria y SORGUN Hoja ancha en general Mojar bien=250-400 L/ha
Control GUSANO GRIS	DECIS EXPERT® Deltametrin 10% + Clorantroprol 20%	100 - 125 cc 0,1 - 0,5 L	Compatible con todos los tratamientos

Consúltenos cualquier duda al Tfno: **987 75 12 11**