

TRATAMIENTO DE VIÑEDO

"BAYER CropScience"



10-15cm Racimos Visibles Inicio Floración Tam. Guisante Cierre Racimo Envero

ENFERMEDAD	PRODUCTO	ACCIÓN	ESTADO FENOLOGICO	DOSIS/ha	DOSIS 16 l	P.S. Días	Nºaplicaciones/ (Intervalo)
MILDIU BLACK-ROT EXCORIOSIS	MIKAL PLUS (Fosetil-AL 50% + Cimoxanilo 4% + Folpet 25%)	PENETRANTE, SISTÉMICO, CONTACTO	Desde 3 hojas hasta prefloración	1,1 kg	60 g	28	1
	MELODY COMBI WG (Iprovalicarb 9% + Folpet 56 3%)	PENETRANTE	Salida de Floración-Tamaño guisante	1,1 - 1,7 kg	60 g	28	4 /(10-14d)
	MILRAZ PRO (Cimoxanilo 33% + Zoxamida 33%)	PENETRANTE	Pre- Floración-Tamaño guisante	0,3 - 0,4 kg	25 g	28	3 /(7d)
	CUPROSAN 520SC (Oxicloruro de cobre 52%)	CONTACTO	Desde prelbración hasta cosecha	1,5 - 1,8 l	80 cc	15	3/(10d)
OIDIO	PROSPER (Spiroxamina 50%)	SISTÉMICO	Desde 2 hojas -Envero	0,6 l	40 cc	35	2/(10-14d)
	FLINT MAX. (Trifloxistrobin 50%)	SISTÉMICO Y MESOSTÉMICO	Pre-floración- Floración	200 g	20 g	21	3
	LUNA EXPERIENCE (Fluopyran 20% + Tebuconazol 20%)	SISTÉMICO	Caída capuchones (Botritis)	120 cc	15 cc	14	1-2
	LUNA PRIVILEGE (Fluopyran 50%)	SISTÉMICO	Desde cuajado-bayas en perdigón	60-70 cc	10 cc	14	1-2
	FLINT (Trifloxistrobin 50%) ELOSAL 80% WG (Azufre 80%)	MESOSTÉMICO CONTACTO	Tamaño Guisante Desde 3 hojas hasta maduración y fruto	100-150 g 1-3 kg	10 g 80 g	30	4/(10-14d) 1-8/(10d)
BOTRITIS	TELDOR (Fenhexamida 50%)	SISTÉMICO	Caída capuchones y envero	0,8 - 1 kg	50 g	14	2/(10d)
ÁCAROS, TRIPS, COCHINILLAS MELAZO, PULGONES Y CICADÉLIDOS PIRAL	FLIPPER (sales potásicas ácidos grasos 48%)	BIOLÓGICO	Inicio aparición de plaga	1 l	80 cc		1-5 /(7d)
	SIVANTOprime (Flupiradifurona 20%)	SISTÉMICO		500 cc	30 cc		1
	DECIS EVO (Deltametrín 2,5%)	CONTACTO/INGESTIÓN		250-700 cc	30 cc	7	3
CARENCIAS	BAYFOLAN AKTIVATOR ®	BIOESTIMULANTE	Brotos de 5cm, floración, cuajado y desarrollo de frutos.	1-3 l	175 cc		1-3
HERBICIDA	Glifae (Glifosato36%)+ Pendimetalina 33% ó Mamut* (diflufenican50%)	CONTACTO	Pre-brotación viñedos con más de 4 años	3-4 l	250-300 cc		
			*Mamut--> Sólo aplicar en viñedos en espaldera	3-4 l	250-300 cc		
		PERSISTENTE		0,5-0,6 l	50-60 cc		

CALENDARIO TRATAMIENTOS VID Y PARRAL

10-15 cm	Racimos Visibles	Inicio Floración	Tam. Guisante	Cierre Racimo	Envero
----------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------



ÉPOCA	PLAGAS	ENFERMEDADES	
	ACARIOSIS, POLILLA Y PIRAL	MILDIU/BOTRITIS Excoriosis / Black Rock	OIDIO
1º MAYO Crecimiento Tallos		Melody Combi 40-100 g ó *ARBEKYN 10 cc	PROSPER 60 cc ó *DOMARK 15 cc
2º JUNIO Inicio Floración	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc	Melody Combi 40-100 g ó *ARBEKYN 10 cc	FLINT 10 g ó *ELOSAL 45 g
3º JULIO Tamaño Guisante	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc	*TELDOR 30 - 50 g	FLINT 10g ó *ELOSAL 45g
4º MITAD AGOSTO Cierre de Racimo	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc	*TELDOR 30 - 50 g	PROSPER 60 cc ó *DOMARK 15 cc

NOTA: (*)Producto autorizado su uso para jardinería exterior doméstica

Las dosis son referidas para 15 L. de agua.

Muy importante mojar bien, por ambos lados, todas las hojas y racimos del parral.

Utilizar las dosis más altas cuando el problema esté declarado y repetir los tratamientos cada 15 días

En caso de duda, consúltenos en el 987 75 12 11

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es

