




Tratamientos Foliare en CEREALES

(Trigos- cebadas-avenas- triticales-centenos)

FUNGICIDAS

PRODUCTO/Composición	Cultivos/Dosis (l/ha)	Momento de aplicación (nº aplicaciones/intervalo)	Control
 (Bixafen 7,5%+protioconazol 15%)	Cebada,avena 0,6-1 L Trigo, triticales 0,8-1,25 L	•Inicio encañado- <u>inicio</u> floración <div style="text-align: center;">2aplic/14días</div> •Inicio encañado- <u>final</u> floración	Roya Parda
			Roya Amarilla
			Septoria
 (Bixafen 75%+ Spiroxamina15%+ Trifloxistrobin10%)	•Trigo blando y duro, triticales, y centeno 0,8-1L •Cebada	•Inicio encañado a final floración <div style="text-align: center;">2aplic/21días</div> •Inicio encañado a inicio floración	Helminthosporium
			Rincosporium
			Oidio
			Fusarium Espiga

INSECTICIDAS

 Deltametrin 1%+ Flupiradifurona 7,5%	0,75 L	Trigo, cebada, centeno, 2/14días al final de la floración-grano pastoso	Tronchaespigas, lemas, nefasia, chinches, polilla, pulgones, garrapatillo.
	0,75-125cc	1aplicación	

CORRECTOR DE CARENCIAS	PRODUCTO	DOSIS (l/ha)
		Bayfolan AKTIVATOR®

NOTA:

- ▶ **MOJAR** bien toda la masa foliar (200-300 l/ha) a 5-6 km/h
- ▶ Con temperaturas superiores a 25º tratar por la mañana ó al atardecer.
- ▶ Utilizar a ser posible, boquillas antideriva de doble abanico.

En caso de realizar un 2º tratamiento, se aconseja realizarlo en estado de HOJA BANDERA desplegada en trigos.

En caso de duda, consúltenos en **987 75 12 11**. Le atenderemos gustosamente.

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es

