

Recomendaciones CULTIVO de PATATAS (*Solanum Tuberosum*)

Abonado-Fondo ENTEC 13-10-20 + (7,5 SO₃) → 1.000-1.200 kg/ha

Cobertera ENTEC EVO 275 (10%SO₃) → 250-300 kg/ha
 ó N-32 (Líquido) → 250-300 kg/ha

TRATAMIENTOS HERBICIDAS

HERBICIDAS PRE-EMERGENCIA (consultar variedad)

PRODUCTO	DOSIS/HA
Challenger® (Aclonifen 60%) (No Monalisa)	2 - 3 L +
+ Pendimetalina (33%) + / ó Pro sulfocar 80%	2 - 3 L + / ó 1,5 - 3 L

HERBICIDAS POST-EMERGENCIA

PRODUCTO	DOSIS/HA
Bentazona (48%) ó 2 tratamientos (3-5 días)	1,5 - 2 L 1+1L

TRATAMIENTOS FOLIARES

PROBLEMA	PRODUCTO/COMPOSICIÓN	DOSIS/ha	P.S Días	Nº Aplicaciones (Intervalo)	OBSERVACIONES
Escarabajo, Orugas, polillas	Decis Expert® (Deltametrina 10%)	75 - 125 cc	7	1-3	Al atardecer
Pulgones	Decis EVO® (Deltametrina 2,5%)	0,3-0,5 L	14	3	Intervenir a la aparición de la plaga
Escarabajo y polilla	Sivanto Energy® (Deltametrina 1% + Flupiradifurona 7,5%)	0,75L		1	Aplicar desde (BBCH13) 10% entrelíneo, hasta 10 días antes del inicio de la floración.
Pulgones, mosca blanca, ácaros y Trips	Flipper® (Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48%)	1L		1-5 (7 días)	Producto biológico
Mildiu y Alternaria	Mikal Plus® (Fosetil 50% + cimoxanilo 4% + folpet 25%)	1 - 2 kg	21	3 (10 días)	Sistémico- penetrante- contacto
	Volare® (Fluopicolida 6,25% + propamocarb 52,5%)	1,2 - 1,6 L	7	4 (7-10 días)	Sistémico y penetrante
	Cuprosan 520 SC® (oxidocloruro de cobre 52%)	1,5 - 4 kg	15	3 (10 días)	Contacto
Estimulante radicular	ERGOSTIN®	0,3 - 0,5 L.			Desde 2-6 hojas/planta
Tuberización	Bayfolan Aktivator®	1-3 L.			Principio floración
Engorde tubérculo	Bayfolan potasio®	3 L.			1 mes antes cosecha

Consulte con su Asesor, llamar al Tel. 987 75 12 11, les atenderemos gustosamente.

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es